




## Note d'information régionale du 27 février 2019

### FERTILISATION AZOTEE

La mesure du reliquat d'azote sortie hiver avec une interprétation propre à la parcelle, est l'unique méthode fiable pour obtenir la fertilisation appropriée. Le respect de la dose préconisée permet d'obtenir l'optimum économique.

**Sur labour d'hiver ou non labour**, nous recommandons de respecter un délai entre l'apport de l'engrais et le semis afin d'éviter toute perturbation de la levée (voir schéma ci-dessous).

Pour les doses > 80 kg/ha, le fractionnement reste une solution de secours lorsque le délai ne peut pas être respecté.



- (1) Un apport d'une dose faible présente peu de risque de pertes de plantes et la dose n'induit pas de forte volatilisation.
- (2) Environ 2/3 de l'apport sur sol nu, et 1/3 au stade deux feuilles  
 Pour tout apport réalisé en post-semis, on recommande d'utiliser une forme ammonitrate, moins sensible à la volatilisation.

**Sur labour de printemps**, apporter l'azote avant labour sans nécessité de respecter un délai entre l'apport et le semis.

### DATE DE SEMIS ET RISQUE MONTEES A GRAINES

En betterave, l'allongement de la période de végétation est synonyme de gain de productivité mais... **avant le 15 mars, il convient de rester prudent car le risque de montées à graines par vernalisation reste important !**

